19870(17)

79-84

动物学研究1997、18(1):79—84

CN 53-1040 Q ISSN 0254-5853

Zoological Research

不同的下丘脑肽和神经递质对鲤鱼促性腺激素 和生长激素分泌活动的影响*

王 黎 林浩然 张为民 (中山大学生物系 广州 510275)

Q959.468

▲ 摘要 以上龄性腺发育中期鲤鱼为材料,采用腹腔 (ip) 注射的方法、研究不同的下丘脑肽和神经递质对鲤鱼促性腺激素 (GtH) 和生长激素 (GH) 分泌的影响。结果表明: 促甲状腺激素 释放激素 (TRH)、L-多巴 (L-DOPA)、甲基睾酮 (MT)、;-氨基丁酸 (GABA)、促黄体素释放激素类似物 (LHRH-A) 和三碘甲状腺原氨酸 (T₁) 都能显著刺激 GtH 的分泌,但最大效应时间各不相同。TRH 和 LHRH-A 能促进 GH 的分泌,L-DOPA、MT、GABA 对血清 GH 水平没有明显影响; T₁则对 GH 分泌有一定的抑制作用。这说明鲤鱼 GtH 和 GH 的分泌除了受各自的下丘脑释放因子和释放抑制因子的双重神经内分泌调控外,还受多种其它相同和不同调节因子的影响,也反映了鲤鱼 GtH 和 GH 分泌的神经内分泌调控的复杂性。

关键词 促性腺激素, 生长激素, 鲤鱼 下丘内农州大, 次中乡至羌庆

在硬骨鱼类、GtH 的分泌受下丘脑促性腺激素释放激素(GnRH)刺激性和多巴胺(DA)抑制性因子的双重神经内分泌调节(Kah等、1993)、而 GH 的分泌则受下丘脑促生长激素释放因子(GRF)刺激性和促生长激素释放抑制因子(SRIF)抑制性的双重神经内分泌调节(Marchant等、1989)。此外、许多种因子又能在下丘脑-垂体-性腺轴和下丘脑-垂体-生长轴的不同水平影响 GtH 和 GH 的分泌(Muller. 1987: Hall 等、1986: Kah等、1993)。本实验选用了几种不同的下丘脑肽和神经递质、研究它们分别对鲤鱼血清 GtH 和 GH 水平的影响,以期对硬骨类 GtH 和 GH 分泌的神经内分泌调控机制作更进一步的探讨。

1 材料和方法

1.1 实验用鱼

1 龄性腺发育中期雌鲤鱼 (GSI: 11.08%—14.48%; 平均体重: 450—600 g) 购于广州农贸市场,实验前在自然光照和水温下暂养于实验鱼塘 5—7 天。

国家自然科学基金 | 青年 | 资助项目

^{* *} 王黎 中山大学生物系鱼类室林浩然教授的博士生

本文 1995 年 11 月 28 日收到, 1996 年 9 月 11 日修回

1.2 实验方法

实验前把鲤鱼分成若干组,每组6—10 尾鱼,分别腹腔注射所用激素和药品。取样时先用 MS-222 麻醉,从尾静脉取血 1 ml, 4℃凝血 4—6 h,离心后收集样品于-25℃保存。样品 GtH 和 GH 含量测定采用本实验室建立的鲤鱼 GtH 和 GH 放射免疫测定法。数据以平均值±标准差表示。用 Duncan 氏新复极差检验各组间 GtH 和 GH 含量的差异。

1.3 实验设计

实验鱼分 7 组; a.P.S. (鱼用生理盐水): b.TRH (1μg/gb.w.): c.L-DOPA (10μg/gb.w.); d.MT (1μg/gb.w.); e.GABA (10μg/gb.w.); f.LHRH-A (0.01μg/gb.w.); g.T₃ (1μg/gb.w.)。注射容量为 1μl/gb.w; 第 1 天第 1 次注射后 1 h、6 h、24 h 取样, 第 3 天第 2 次注射后 1 h、6 h、24 h 重复取样。

2 实验结果

2.1 注射 TRH、L-DOPA、MT、GABA、LHRH-A、T3 对鲤鱼血清 GeH 水平的影响




图1 注射TRH、L-DOPA、MT、GABA、LHRH-A、T₃ 对鲤鱼血清 GtH 水平的影响 Fig 1 Effects of TRH、L-DOPA、MT、GABA、LHRH A、T₃ on serum GtH levels in common carp 数据以平均值生标准差表示。每组 6—10 尾鱼Ivalues presented are the Mean= SE of six to ten fishes per group)_e

*, P<0.05 表示显著性差异: * *, P<0.01 表示极显著性差异(vs. controls)。

÷

(†

†

ф.

1

由图 1、第 1 次注射 TRH 后 1 h、6 h、24 h,血清 GtH 水平没有明显变化;第 2 次注射后 1 h、血清 GtH 水平极显著性升高,6 h 后仍高于对照组,24 h 后回落到接近基础水平、注射 L-DOPA 引起的 GtH 分泌反应和注射 TRH 非常相似,第 1 次注射 MT 的所有取样时间,GtH 水平也没有明显变化;第 2 次注射后 6 h、GtH 水平极显著性升高,24 h 后回落。第 1 次注射 GABA 后 1 h,GtH 值呈显著升高,并在 6 h 达最高值,24 h 后恢复到基础水平;第 2 次注射后 1 h,GtH 再次升高,并在 6 h 达最高值,24 h 后回落。第 1 次和第 2 次注射 LHRH-A,在所有取样时间,都能极显著性刺激 GtH 的分泌,在第 2 次注射后 6 h、GtH 分泌达最高峰。注射 T₃,第 1 次注射后 24 h、GtH 水平明显升高,第 2 次注射后的 1 h 和 6 h,仍维持在较高水平,24 h 后恢复到基础水平。

2.2 注射 TRH、L-DOPA、MT、GABA、LHRH-A、T、对鲤鱼血清 GH 水平的影响

由图 2、注射 TRH、只在 1 次注射后 24 h、GH 水平明显升高、其余时间没有影响。两次注射 L-DOPA、在所有取样时间、都没有发现 GH 水平的变化。注射 MT、GH 的分泌反应和注射 L-DOPA 相似。注射 GABA、没有发现其对 GH 分泌的明显影响。注射 LHRH-A、在第 1 次注射后 1 h 和第 2 次注射后 24 h、血清 GH 水平明显高于对照组、其余时间则没有明显变化。注射 T₃、在第 1 次注射后 24 h、血清 GH 水平明显降低、在其它取样时间都不明显影响血清 GH 水平。




图 2 注射 TRH、L-DOPA、MT、GABA、LHRH A、T, 对鲤鱼血清 GH 水平的影响 Fig.2 Effects of TRH、L DOPA、MT、GABA、LHRH-A、T₃ on serum GH levels in common carp 图注同图 lifor details, see legend to Fig.11₂

3 讨论

本研究发现,TRH、L-DOPA、MT、GABA、LHRH-A、T₃ 都能显著刺激鲤鱼GtH 的分泌、但它们的效应时间和作用强度有较大差异。对 GH 分泌的影响,TRH 和LHRH-A 能在一定时间刺激 GH 的分泌,L-DOPA、MT、GABA 对 GH 水平没有影

啊。T、对 GH 分泌有一定的抑制作用。

TRH 被认为在整个脊椎动物都是一种 GRF、也能够刺激硬骨鱼类的 GH 分泌 (Harvey 等, 1990), 但对鱼类 GtH 的分泌、已证明没有影响。本研究发现,TRH 不仅能刺激鲤鱼 GH 的分泌,也能显著刺激鲤鱼 GtH 的分泌,这与其他学者对金鱼等其它硬骨鱼类的研究结果不一致 (Marchant 等, 1989)。本研究发现的 TRH 对 GtH 分泌的刺激作用是在第 3 天第 2 次注射后,而且 GtH 水平极显著高于对照组、表明在鲤鱼也可能存在有 TRH 对 GtH 分泌的刺激作用,这有待于进一步研究予以证实。

在哺乳类、L-DOPA 对 GH 分泌的作用差异较大。L-DOPA 能诱导猕猴和狗的 GH 释放、但抑制羊和鼠的 GH 分泌(Arimura 等、1985) 在金鱼、i.p 注射 L-DOPA 能够增加血清 GH 水平、对 GtH 分泌则起抑制作用(Chang 等、1985)。本研究却发现、L-DOPA 对鲤鱼血清的 GH 水平没有明显影响,但却在第 3 天第 2 次注射后明显刺激 GtH 的释放。前人的工作已证明 DA 能抑制硬骨鱼类的 GtH 分泌、刺激 GH 的分泌。已知 L-DOPA 是 DA 的前体物,因此对鱼类 GtH 和 GH 的分泌具有和 DA 相同的作用。本研究发现,L-DOPA 不能刺激鲤鱼 GH 的分泌,可能是所用的剂量较低。因为 Chang 等(1985)证明、L-DOPA 对 GH 分泌的刺激作用存在着剂量依存关系,低剂量的 L-DOPA 不能刺激 GH 的分泌。但 L-DOPA 对鲤鱼 GtH 分泌的极显著刺激作用还难以解释。其效应时间和 TRH 是一致的。因此,在鲤鱼是否存在有 L-DOPA 对 GtH 分泌的刺激作用,还有待深入的研究探讨。

在哺乳类、性类固醇激素对 GH 的分泌起"允许" (permission) 作用 (Hall 等, 1986)、通过改变垂,本对刺激性因子的反应性影响 GH 的分泌、或通过对下丘脑的反馈作用影响 GH 的分泌 (Hall 等, 1986)。在鳗鲡 (Dufour 等, 1988)、睾酮 (T) 能通过增加内源性 GnRH 的合成和释放 (Goos 等, 1987)、引起 GtH 的释放 (Grim 等, 1982)。i.p 注射甲基睾酮 (MT)、同样能引起性未成熟虹鳟垂体 GtH 含量的增加、刺激 GtH 的释放 (Crim 等, 1982)、但没有发现 MT 对 GH 分泌的影响。本实验结果也表明,MT 能显著刺激鲤鱼 GtH 的分泌,对 GH 的分泌没有明显的影响。这与前人的研究结果是一致的

在哺乳类, GABA 被证明参与了 GH 分沁的中枢调控 (Arimura 等、1985), 如对鼠的 GH 分泌起刺激或抑制作用 (Muller 等、1987)。对金鱼的研究发现, 1.p 注射 GABA 能刺激性腺发育早期和退化期金鱼的 GtH 释放、对性腺成熟期金鱼没有影响 (Kah 等、1992)、GABA 也不能刺激静态或孵育培养的分散垂体细胞的 GtH 释放 (Kah 等、1993)。GABA 的作用被认为是通过抑制 DA 能神经元的活性或刺激 GnRH 神经元的活性从而引起 GtH 的释放 (Sloley 等、1992; Trudeau 等、1993) GABA 对 GH 分泌的作用尚不清楚。在本研究中,GABA 同样能显著刺激鲤鱼 GtH 的分泌; 对 GH 的分泌没有明显的影响。这反映出在不同的硬骨鱼类中,GABA 对 GtH 分泌的影响具有一定的普遍性。

在硬骨鱼类、LHRH-A 既是 GtH 分泌的释放因子、也起着 GH 释放因子的作用 (Marchant 等、1989)。本实验发现、LHRH A 能极显著性刺激鲤鱼 GtH 的释放、对 GH 的释放具有一定的刺激作用、但并不强。这可能与所有药物的剂量及鲤鱼所处的性腺发育状态有关。

在哺乳类、甲状腺素(T₃)能促进 GH 的合成和释放、增加 GH 细胞对各种刺激的反应性(Sonntag 等、1981) 但 T₃ 对鸟类的 GH 分泌起抑制作用(Harvey、1990)。T₃ 对硬骨鱼类 GtH 和 GH 分泌的影响、了解甚少。本实验发现、T₃ 能明显刺激鲤鱼 GtH 分泌。在第 1 次注射后 24 h,对鲤鱼 GH 的分泌具有抑制作用。其作用机理目前还不清整

另外、本实验发现, 对照组在第 1 次注射生理盐水后的 24 h, 其 GH 水平比 1 h 后 有较大差异。这种现象在我们做的其它实验中也出现过, 其具体原因尚不清楚。也可能是实验误差造成的, 或鱼的生理状况发生了变化。

总之、本实验对比研究了TRH、L-DOPA、MT、GABA、LHRH-A和T、对性腺发育中期鲤鱼 GtH和GH分泌的影响、对前人所做的工作做了进一步的验证和补充、并为进一步深入阐明硬骨鱼类 GtH和GH分泌的神经内分泌调节机理提供了一定的理论依据。

参考文献

- Armura A, Culler M D. 1985. Regulation of growth hormone secretion. In: Imura H. ed. The Pituitary Gland. New York: Haven Press. 221–258.
- Chang J.P., Marchant T.A. Cook, A.F. et al., 1985. Influences of catecholamines on growth hormone release in female goldfish, Carassius caratus. Neuroendoct., 55: 351-360.
- Crim f. W. Evans D.W., 1982. Positive steroid feedback on gonadotopic hormone in juvenile rainbow (tout: evidence of gonadotropin synthesis and release following testosteron administration via silastic capsules. (am.) amp. Endo v. 37, 192–196.
- Dufour S. Lopez E. LeMenn F *et al.*, 1988. Stimulation of gonadotropin release and or ovariaz development by the administration of a gonadohberin agonist and of dominine antagonist in female silver eet predicated with consider Comp. Endow. 70, 20–30.
- Goos H J I, Joy K P, Gielen I III of all 1987. The effect of intermixing hormone releasing homone analogus(EHRHa) in combination with different drugs with antidopamine and artic serotomic properties on gonadotropin release and evulation in the Atrican cartish. Clarias gavegous Aquaculture, 63, 143-156.
- Hall T.R., Harvey S., Scines C.G., 1986. Control of growth hormone secretion in the vertebrates, a comparative survey. com; Biochem. Physiol. 84A(2), 231–253.
- Harvey S (1990). Thyrotropic releating hormone, a growth hormone releasing factor. J. Endocr., 125, 345, 358.
- Kah Ö. Trudeau V. I., Sloley B. P. + al. 1997. Influence of GABA on gonadotropin telease in the goldfish. Neuroendors, 55: 396-404.
- Kah O, Augktde I, Lepretre F et al. 1993. The reproductive brain in 68h. 13th Physial. Blachem. 11: 85-98.
- Marchant T A Peter R E 1989 Hypothalamic peptides influencing growth hormonic secretion in the goldfish, Caravino auratus, Fish Physiol. Biochem. 7(1-4): 133-139.
- Muller E. E., 1987. Neural control of somatotropic function. Physiol. Reviews. 67(3): 962-1032.
- Shogly B D K th O Vance L et al. 1992. Ammo acid neutotransmitters and dopaintne in the regulation of gonadotropin secretion. J. Neurochem., 58: 2254–2262.
- Sonntag W. E. Forman, L. J. Fiorn J. M. et al. 1981. Effects of CNS active drugs and somatostatin antiserini on growth formone telease in rats. *Neuroendoct*, 33: 73-78.
- Trudeau V.E. Sloley B.D. Peter P. C. 1903. PARA stimulation of gonadatropin-II release in goldfish involvement of GABA, receptors, donam as a last operate for Physics Society, R348-355.

EFFECTS OF DIFFERENT HYPOTHALAMIC PEPTIDES AND NEUROTRANSMITTERS ON GONADOTROPIN AND GROWTH HORMONE SECRETION IN COMMON CARP (*Cyprinus carpio* L.)

Wang Li Lin Haoran Zhang Weimin

(Department of Biology, Zhongshan University Guangehniu 510275)

Abstract

Effects of different hypothalamic peptides and neurotransmitter on gonadotropin and growth hormone secretion in 1-year common carp at midrecrudenceses indicated that TRH. L-DOPA. MT, GABA. LHRH-A and T₃ could significantly stimulate GtH secretion, but their affecting time and tone were different from each other. TRH and LHRH-A also have GH stimulatory actions. No effects have been found of L-DOPA, MT and GABA on serum GH secretion; T₃ has inhibitory effect on GH release.

Key words Gonadotropin, Growth hormone, Common carp